

LÉVOMENTHOL **CLIPTOL** IBUPROFÈNE
GEL

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CLIPTOL, gel et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CLIPTOL, gel ?
3. Comment utiliser CLIPTOL, gel ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLIPTOL, gel ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CLIPTOL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TOPIQUE POUR DOULEURS ARTICULAIRE ET MUSCULAIRE

Ce médicament est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans) en traitement de courte durée des traumatismes bénins : entorses bénignes (foulures), contusions, traumatismes sportifs.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CLIPTOL, gel ?

N'utilisez jamais CLIPTOL, gel :

- En cas d'antécédents rénaux, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN. Ce médicament peut aggraver une insuffisance rénale préexistante.
- Les effets indésirables sont réduits en utilisant la dose minimale efficace, le moins longtemps possible. RESPECTEZ LA POSOLOGIE.

- Bien se laver les mains après chaque utilisation, sauf si elles font partie de la zone à traiter.

Ne pas utiliser CLIPTOL, gel dans les cas suivants :

- à partir du 6^e mois de la grossesse,
- antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proches telles que autres AINS, aspirine,
- antécédent d'allergie au lévomenthol ou à l'un des excipients,
- sur une peau lésée, quelque soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie,
- en association avec un autre topique sur la même zone douloureuse.

Prendre des précautions particulières avec CLIPTOL, gel :

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- L'apparition d'une éruption cutanée, après application du gel, impose l'arrêt immédiat du traitement.
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif.
- En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement ou en cas d'aggravation, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
- Ce médicament contient du propylène glycol qui peut induire des irritations de la peau.

Prise d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse – Allaitement (par extrapolation avec la voie orale)

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 premiers mois de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

À PARTIR DU 6^e MOIS DE GROSSESSE, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de CLIPTOL, gel

Ce médicament contient du propylène glycol et de l'alcool.

3. COMMENT UTILISER CLIPTOL, gel ?

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Appliquer environ 10 à 40 mm de gel par prise.

Voie locale.

USAGE EXTERNE.

Appliquer le gel sur la zone douloureuse et masser légèrement jusqu'à absorption.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

En moyenne, 1 application 2 à 3 fois par jour, en respectant un minimum de 4 heures entre chaque application.

Ne pas dépasser 3 applications par jour.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement ou en cas d'aggravation, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Si vous avez utilisé plus de CLIPTOL, gel que vous n'auriez dû :

Rincer abondamment à l'eau.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser CLIPTOL, gel :

Ne pas appliquer une dose de CLIPTOL, gel supérieure pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CLIPTOL, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Peuvent survenir des réactions allergiques :

- Cutanées : éruption, démangeaisons, urticaire, rougeurs, dessèchement de la peau, sensations de brûlures, dermatite et moins fréquemment un décollement de la peau pouvant s'étendre rapidement de façon grave à tout le corps,
- respiratoires : asthme, gêne respiratoire,
- générales : brusque gonflement du visage et du cou (oedème de Quincke).

Dans tous ces cas, arrêter immédiatement le traitement et consulter votre médecin.

D'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent survenir. Ils sont fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Dans tous ces cas, avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CLIPTOL, gel ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Ce médicament est à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CLIPTOL, gel ?

Les substances actives sont :

Ibuprofène.....	5,0 g
Lévomenthol.....	3,0 g

Pour 100 g de gel.

Les autres composants sont :

Propylène glycol, di-isopropanolamine, carbomère 980, éthanol à 96 %, eau purifiée dont excipients à effet notoire : propylène glycol, alcool.

Qu'est-ce que CLIPTOL, gel et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 50 g. Boîte de 1.

Titulaire / Exploitant

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, Place Abel-Gance

92654 Boulogne Cedex

Fabricant

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

ÉTABLISSEMENT PROGIPHARM

Rue du lycée

45502 Gien Cedex

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :

Conformément à la réglementation en vigueur.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 avril 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Information médicale : 0 800 950 564


Pierre Fabre

723 811



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.